

# فراوانی و علل خطاهاي پرستاري و موافع گزارش دهی آن در دانشجويان اتاق عمل

شيرين آذرآباد<sup>۱</sup>، سيد سينا زمان<sup>۲</sup>، بیژن نوري<sup>۳</sup>، سينا ولائي<sup>۴</sup>

تاریخ پذیرش: ۹۷/۰۳/۳۰

تاریخ دریافت مقاله: ۹۶/۰۸/۲۳

چکیده:

**مقدمه:** اتاق عمل با توجه به انجام پروسهای تهاجمی متعدد می‌تواند بستری برای بروز انواع خطاهاي پرستاري باشد. دانشجويان نیز در فرآیند یادگیری قرار دارند که می‌تواند منجر به بروز خطا از سوی آنان گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان و علل خطاهاي پرستاري و موافع گزارش دهی آن در دانشجويان اتاق عمل انجام شد.

**روش‌ها:** برای انجام این پژوهش توصیفی - تحلیلی، ۱۲۰ دانشجويان رشته اتاق عمل به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، خطاهاي پرستاري در اتاق عمل و عوامل موثر بر عدم گزارش دهی خطا استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و از طریق نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفت.

**یافته‌ها:** بیشترین میزان خطا مربوط به عدم رعایت تکنیک استریل (۷۸/۳ درصد)، واکنش به خون یا فرآورده‌های خونی (۷۵/۵ درصد) و باقی ماندن جسم خارجی در محل جراحی (۷۳/۳ درصد) بود. مهم‌ترین علل بروز خطا از دیدگاه دانشجويان نیز شامل نداشتن اطلاعات کافی (۸۲/۵ درصد)، حواس‌پرتی (۷۹/۲ درصد) و اجبار به انجام چندین کار همزمان (۷۸/۳ درصد) بود. مهم‌ترین علل گزارش نکردن خطا نیز به ترتیب ترس از آشکار شدن اشتباه و ایجاد مسائل قضایی به دنبال آن (۵۷/۵ درصد) و ترس از تاثیر اشتباه در نمره ارزشیابی و بروز پیامدهای آموزشی به دنبال آن (۵۷/۵ درصد) بود.

**نتیجه‌گیری:** بهترین راه کاهش میزان خطا، پیشگیری است. لذا با شناسائی خطاهاي پرستاري و علل بروز آن از دیدگاه دانشجويان، مربيان باليني می‌بایست اقدامات لازم جهت پیشگیری از بروز خطا را در دوران تحصيل بویژه آموزش باليني دانشجويان اجرا نمایند. ارتقاء فرهنگ گزارش دهی خطا بخصوص در دوران دانشجوئي با حمایت و کاهش تاثير بر ارزشیابي آنان توصیه می‌گردد.

**کلید واژه‌ها:** ايمني، خطاي پزشكى، پرستاران، اتاق عمل، دانشجويان

## مقدمه

پزشكان، پرستاران و داروسازان رخ می‌دهد، اما بروز اشتباهات در پرستاران بيشتر از سايرو شاغل بهداشتی و پزشكى است (۱). از طرفی مطرح شدن روزافزون پرونده‌های پزشكى در سطح جامعه که باعث افزایش نگرانی عمومی نسبت به ايمني در ارائه خدمات سلامت گردیده است، اهمیت اين مساله را بيشتر آشکار می‌کند (۲). اين اشتباهات می‌تواند در هر مرحله از فرایندهای مربوط به بيمار رخ داده و موجب آسيب و يا حتى مرگ بيمار شود (۳). لذا ایجاد سیستم ايمن در ارائه خدمات بهداشتی درمانی و ارتقای كیفیت مراقبت‌های ارائه شده در مراکز درمانی منوط به کاهش اشتباهات ناخواسته و اجتناب‌ناپذير است (۴).

چالش‌ها و عوامل بسياري از جمله بار زياد کار پرستاران، زياد بودن تعداد بيماران، وضعیت ناپايدار بيماران، کمبود آگاهی پرستاران، فضای کاري نامناسب و عدم پشتيبانی و همکاري با پرسنل باتجربه در ايجاد خطاها نقش دارند (۵،۶). وقوع خطا عوارض جانی از قبيل افزایش نرخ مرگ و میر در ميان بيماران، افزایش مدت اقامت، افزایش هزينه، نارضایتی و

ایمنی بيمار به عنوان يك نگرانی اصلی در سیستم ارائه مراقبت‌های بهداشتی و درمانی مطرح بوده (۷) و خطا علاوه بر اين که مهم‌ترین تهدید ايمني بيمار می‌باشد، به عنوان يك شاخص مهم کیفیت مراقبت‌های بهداشتی درنظر گرفته می‌شود (۸). خطا به عنوان شکست در توالی طرح‌ریزی شده فعالیت‌های فكري و فيزيکي برای رسیدن به پيامد مورد نظر، هنگامی که نتوان اين شکست را به شانس مرتبط نمود، تعريف می‌گردد (۹). اعضای تیم پزشكى نیز مانند سايرو انسان‌ها بدون درنظر گرفتن اين که چه قدر ماهر، متعدد و با دقت باشند، ممکن است در هنگام انجام مراقبت از بيماران دچار خطا و اشتباه شوند (۱۰).

## اين اشتباهات در حرفة‌های مختلف کادر درمان مانند:

نويسنده مسئول: سينا ولائي، مرکز تحقیقات مراقبت باليني، دانشگاه علوم پزشكى كردستان، سنندج، ايران  
valiee@muk.ac.ir  
شيرين آذرآباد، دانشجوی كارشناسی اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی،  
دانشگاه علوم پزشكى كردستان، سنندج، ايران  
سید سينا زمان، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشكى كردستان، سنندج، ايران  
بيژن نوري، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده توسعه سلامت،  
دانشگاه علوم پزشكى كردستان، سنندج ايران

توسط مرتبی نیز می‌تواند از عوامل عدم گزارش‌دهی خطا در دانشجویان باشد (۱۶) در تحقیق یعقوبی و همکاران (۲۰۱۵) بر روی دانشجویان پرستاری مشخص شد که تنها ۱۶/۷ درصد از دانشجویان گزارش خطای خود را به مرتبی اطلاع می‌دادند (۱۷) و با توجه به این که گزارش‌دهی اشتباهات می‌تواند باعث بهبود ایمنی بیماران شود، مرتبان پرستاری باید یک واکنش مثبت در قبال گزارش‌دهی اشتباهات در دانشجویان داشته باشند (۱). در مطالعه حیدری و همکاران نیز مشخص شد که اصلاح روش‌های آموزش، نظارت مرتبان و استفاده از استراتژی‌های غیرتنيهی جهت کاهش بروز اشتباهات و گزارش به موقع آن‌ها لازم است (۱۸).

یکی از بخش‌های درمانی بیمارستان که براساس نیازهای سازمانی، آموزشی، محیطی و تکنولوژیکی از پرخطرترین بخش‌های بیمارستان شناخته شده است و خطرناکترین پروسیجرها در آن انجام می‌شود، بخش اتاق عمل ۲۳۴ می‌باشد (۱۹). آمارها نشان می‌دهد که هر ساله در حدود ۲۳۴ میلیون عمل جراحی در کل دنیا انجام و به طور میانگین از هر ۲۵ نفر یک نفر تحت عمل جراحی در سال قرار می‌گیرد (۸). بیشترین حوادث اتفاق افتاده و غرامت‌های واردہ به بیمارستان نیز مربوط به اتاق عمل و بخش‌های اورژانس بوده است (۲۰). شواهد نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته نزدیک به ۵۰ درصد از کل وقایع ناخواسته در بیمارستان‌ها، در اتاق‌های عمل رخ می‌دهد و بیش از نیمی از مرگ‌ها و عوارض ناشی از جراحی‌ها در صورت رعایت استانداردهای اتاق عمل قابل اجتناب هستند (۸).

بنابراین با توجه به اهمیت بروز خطا در اتاق عمل و لزوم گزارش موارد رخ داده به ویژه در میان دانشجویان و تعیین موانع گزارش آن جهت پیشگیری از بروز خطا و گزارش آن پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان و علل خطاهای پرستاری و موانع گزارش‌دهی آن در دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام گرفت.

## روش‌ها

این پژوهش توصیفی - تحلیلی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته اتاق عمل که حداقل یک ترم را در اتاق‌های عمل بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سپری کرده بودند، را تشکیل می‌داد. ۱۴۰ دانشجو در رشته اتاق عمل مقطع کارشناسی در سال ۹۴-۹۵ مشغول به تحصیل بودند که در این مطالعه به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد ۱۴۰ پرسشنامه با

کاهش اعتماد به سیستم را به دنبال دارند (۱۳). در این راستا استفاده از رویکرد سیستمی جامع، جهت بررسی خطا و اتخاذ تصمیمات مناسب جهت جلوگیری از بروز خطاهای در حیطه‌های بهداشتی و درمانی مورد تأکید قرار دارد (۱۴). بنابراین بررسی نوع و علل خطاهای اولین قدم در پیشگیری از آن‌ها است (۶) و تشخیص به موقع خطا به اندازه استراتژی‌های کاهش خطا در افزایش کیفیت مراقبت از بیماران با اهمیت است (۱۳).

گزارش خطاهای پرستاری نیز به عنوان یکی از شاخص‌های ایمنی بیمار در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند سبب کاهش عوایق جدی آن در دو سطح عملی و اخلاقی شود و استفاده از اطلاعات به دست آمده از گزارش خطا می‌تواند در مدیریت خطاهای موجود و جلوگیری از اشتباهات آینده مفید باشد (۲). به طور کلی می‌توان فاکتورهای عدم گزارش خطا را به دو دسته فاکتورهای سازمانی و فردی تقسیم‌بندی نمود که از این فاکتورها می‌توان به نحوه بازخورد و واکنش مقامات، اقدام انطباطی، عدم شناخت و آگاهی کافی در مورد خطا، ترس از توبیخ و یا سرزنش شدن و انتقام بالقوه اشاره کرد (۱۵). صیدی (۲۰۱۲) گزارش کرد که فقط ۴۵ درصد از پرستاران خطای خود را به سرپرستار گزارش می‌دهند (۱۲). در مطالعه موحدنیا (۲۰۱۴) نیز ترس از پیامدهای گزارش‌دهی مهم‌ترین عامل عدم گزارش خطا در میان پرستاران بود (۱۵). در مطالعه کوههستانی و همکاران نیز ترس از پیامدهای گزارش‌دهی و عوامل مدیریتی دو عامل مهم در گزارش نکردن خطاهای بود (۱). بنابراین ایجاد یک محیط امن برای کارکنان پرستاری پس از وقوع خطاهای می‌تواند میزان اشتباهات را به پایین‌ترین سطح ممکن کاهش و گزارش اشتباهات اجتناب‌نایدیر به مقامات ارشد بدون ترس از عوایق آن را افزایش دهد (۱۳). عدم گزارش خطا همچنین می‌تواند پیامدهای اخلاقی و حرفاًی مانند عدم شناخت آسیب‌های قابل اجتناب به بیماران، عدم رعایت اصول امانت‌داری، در خطر قرار گرفتن اعتماد بین پرستل و بیماران و به طور کلی در خطر قرار گرفتن جایگاه و شهرت حرفه پرستاری را به دنبال داشته باشد (۲).

دانشجویان نیز ممکن است به علت تجربه و مهارت پایین بیشتر از پرستاران مرتکب خطا شوند (۷). در مطالعه کوههستانی و باقچگی (۲۰۰۹) ترس از پیامدهای گزارش‌دهی، ترس از نمره ارزشیابی و پیامدهای آموزشی، عدم وجود بازخورد مثبت به دنبال گزارش‌دهی اشتباه بیشترین دلیل عدم گزارش خطا از سوی دانشجویان بود (۱). همچنین ترس از تنبیه

و در اختیار محقق قرار گرفت و پس از وارد کردن اطلاعات در نرم‌افزار آماری در قسمت توصیف اطلاعات فراوانی، میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه (دموگرافیک، فراوانی خطای علل بروز خطا و موائع گزارش‌دهی آن) گزارش و جهت تعیین رابطه عوامل دموگرافیک با فراوانی خطای علل بروز خطا و موائع گزارش‌دهی از رگرسیون لجستیک استفاده شد. به این منظور سه متغیری که دارای بیشترین میزان فراوانی بودند در مدل رگرسیون وارد شدند.

### یافته‌ها

نتایج اطلاعات دموگرافیک پژوهش نشان داد که از کل ۱۲۰ نفر شرکت‌کننده ۶۷/۵ درصد زن، ۹۴/۲ درصد مجرد، ۳۰/۸ درصد از دانشجویان ترم دو، ۲۷/۵ درصد ترم چهار، ۳۰/۶ درصد ترم شش و ۲۵ درصد ترم هشت بودند. همچنین میانگین سنی شرکت‌کنندگان ۲۱/۴۹±۱/۳۵ سال بود.

نتایج نشان داد که بیشترین میزان خطای مربوط به عدم رعایت تکنیک استریل (۷۸/۳ درصد) و واکنش به خون یا فرآوردهای خونی (۷۵/۵ درصد)، باقی ماندن جسم خارجی در محل جراحی (۷۳/۳ درصد) و محاسبه اشتباه دوز/دوماً داروها (۷۳/۳ درصد) به ترتیب در رده‌های بعدی قرار داشتند. همچنین یافته‌ها نشان داد که نداشتن اطلاعات کافی (۸۲/۵ درصد)، حواس‌پرتی (۷۹/۲ درصد)، اجبار به انجام چندین کار همزمان (۷۸/۳ درصد) و خستگی (۷۷/۵ درصد) به ترتیب بیشترین علت بروز خطای بودند (جدول ۱).

همچنین نتایج این مطالعه نشان داد، بیشترین علل گزارش نکردن خطای به صورت کلی به ترتیب ترس از آشکار شدن اشتباه و ایجاد مسائل قضایی به دنبال آن (۵۷/۵ درصد)، ترس از تاثیر اشتباه در نمره ارزشیابی و بروز پیامدهای آموزشی به دنبال آن (۵۷/۵ درصد)، به دلیل اینکه در صورت بروز مشکل مربی فقط به شخصی که مرتبک اشتباه شده تمرکز می‌کند و سایر عوامل را در نظر نمی‌گیرد (۵۵/۸ درصد)، در صورت بروز مشکل مربی واکنشی نامتناسب با شدت و اهمیت اشتباه از خود نشان می‌دهد (۵۵ درصد) و ترس از اطلاع دادن به مربی و سرزنش شدن توسط او (۵۵ درصد) بود (جدول ۲).

توجه به ملاک‌های ورود (اختیاری بودن شرکت در پژوهش، دانشجویی کارشناسی رشته اتاق عمل، گذراندن حداقل یک ترم کاراموزی در اتاق عمل، عدم انجام کار دانشجویی در اتاق عمل) و خروج (انصراف از شرکت در مطالعه و ناقص پر شدن پرسشنامه توسط دانشجویان) توزیع شد و بعد از زمان مقرر جمع‌آوری گردید که از این تعداد ۲۰ نفر پرسشنامه را ناقص پر کرده یا برنگرداندند و از مطالعه خارج شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه چهار قسمتی بود که با توجه به هدف پژوهش از پرسشنامه خطاهای پرستاری در اتاق عمل به شرح زیر استفاده شد: پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک (جنس، سن، ترم تحصیلی)، نوع خطای (۱۵ گویه)، علل بروز خطای (۲۴ گویه) و پرسشنامه علل عدم گزارش خطای (۱۷ گویه) بود. گویه‌های دارای بیشترین فراوانی انتخاب شده توسط واحدهای مورد پژوهش به عنوان نتیجه مطالعه در نظر گرفته شد. گویه‌های بخش فراوانی و علل خطای از پرسشنامه "خطاهای پرستاری در اتاق عمل" طراحی شده توسط چاره (۲۰۱۰) (۱۸) که در کشورمان توسط طیفوری و ولیئی (۲۰۱۵) استفاده و پایائی آن با ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۹ گزارش شده است (۱۹)، بدست آمد. گویه‌های بخش موائع گزارش‌دهی خطای از پرسشنامه "عوامل موثر بر عدم گزارش‌دهی خطای" که در مطالعه یعقوبی و همکاران (۲۰۱۵) استفاده و پایائی آن با ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۸ گزارش شده است (۱۷). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS Ver.16 و روش‌های آماری توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی) و تحلیلی (رگرسیون لجستیک) استفاده شد. ملاحظات اخلاقی صورت گرفته در این پژوهش شامل، اخذ مجوزهای لازم از دانشگاه علوم پزشکی کردستان و مسئولین دانشکده پرستاری و مامائی، توضیحات کامل درباره اهداف و روش کار برای شرکت‌کنندگان، کسب رضایت کتبی آگاهانه از آنان در ابتدای فرایند، حق خروج از تحقیق در هر زمان و به دانشجویان اطمینان داده شد که تمامی اطلاعات آنان محفوظ خواهد ماند و در صورت تمایل نتایج پژوهش در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. همچنین مجوز از کمیته اخلاق دانشگاه IR.MUK.REC.1395.67 به شماره ۱۲۰ پرسشنامه تکمیل (۷/۸۵ درصد) کسب گردید. در نهایت در نهایت ۱۲۰ پرسشنامه تکمیل

جدول ۱: فراوانی دیدگاه دانشجویان در مورد تعریف خطاهای پرستاری و علل بروز آن

مخالفم	نظری ندارم			موافقم			عبارات
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
۱۲/۵	۱۵	۱۵/۸	۱۹	۷۱/۷	۸۶		مشخص نبودن محل جراحی
۱۵/۸	۱۹	۱۲/۵	۱۵	۷۱/۷	۸۶		مشخص نبودن سمت عمل جراحی (راست یا چپ در عمل‌های دوطرفه)
۱۱/۷	۱۴	۲۷/۵	۳۳	۶۰/۸	۷۳		نامناسب قراردادن پدھای الکتروسرجیکال
۱۲/۵	۵	۲۰/۸	۲۵	۶۶/۷	۸۰		نامناسب بودن پوزیشن بیمار
۱۰/۰	۱۲	۱۶/۷	۲۰	۷۳/۳	۸۸		محاسبه اشتباه دوز/دوم داروها
۱۵/۰	۱۸	۱۷/۵	۲۱	۶۷/۵	۸۱		شمارش نادرست گارهای جراحی
۱۲/۳	۱۶	۲۰/۰	۲۴	۶۶/۷	۸۰		شمارش نادرست ابزارهای جراحی
۷/۵	۹	۱۴/۲	۱۷	۷۸/۳	۹۴		عدم رعایت تکنیک استریل
۸/۳	۱۰	۲۰/۰	۲۴	۷۱/۷	۸۶		استفاده نادرست از تجهیزات
۱۲/۵	۱۵	۱۸/۳	۲۲	۶۹/۲	۸۳		کمبود تجهیزات مناسب
۱۵/۸	۱۹	۲۶/۷	۳۲	۷۵/۵	۶۹		واکنش به خون یا فرآورده‌های خونی
۸/۳	۲۲	۲۵/۰	۳۰	۵۶/۷	۶۸		پرپ نادرست محل جراحی
۱۲/۳	۱۶	۲۰/۰	۲۴	۶۶/۷	۸۰		بی‌اطلاعی از آلرژی بیمار
۱۶/۷	۲۰	۱۵/۰	۱۸	۶۸/۳	۸۲		عدم تشخیص بیمار صحیح
۱۲/۵	۱۵	۱۴/۲	۱۷	۷۳/۳	۸۸		باقی ماندن جسم خارجی در محل جراحی
۸/۳	۱۰	۲۰/۰	۲۴	۷۱/۷	۸۶		نا‌آشنایی با پروسیجر
۲۷/۵	۳۳	۲۶/۷	۳۲	۴۵/۸	۵۵		خطای من ناشی از خطای فرد دیگر
۱۵/۰	۱۸	۲۲/۳	۲۸	۶۱/۷	۷۴		تصمیم‌گیری سریع
۷/۵	۹	۱۳/۳	۱۶	۷۹/۲	۹۵		حوالس پرتری
۱۴/۲	۱۷	۲۷/۵	۳۳	۵۸/۳	۷۰		نظارت ناکافی مدیران
۱۷/۵	۲۱	۲۶/۷	۳۲	۵۵/۸	۶۷		کمبود پرسنل
۱۵/۸	۱۹	۱۴/۲	۱۷	۷۰/۰	۸۴		کمبود لوازم و تجهیزات مناسب
۸/۳	۱۰	۱۴/۲	۱۷	۷۷/۵	۹۳		خستگی
۶/۷	۸	۲۶/۷	۳۲	۶۶/۷	۸۰		نقص در سیستم ارائه خدمات
۷/۵	۹	۲۲/۵	۲۷	۷۰/۰	۸۴		رعایت نکردن استاندارد پروسیجرها
۱۵/۸	۱۹	۲۷/۵	۳۳	۵۶/۷	۶۸		رعایت نکردن استانداردها و سیاست‌های بیمارستان
۵/۰	۶	۲۹/۲	۳۵	۶۵/۸	۷۹		اورینت نبودن
۱۵/۰	۱۸	۲۵/۸	۳۱	۵۹/۲	۷۱		عدم وجود روابط مناسب بین اعضای تیم جراحی
۷/۵	۹	۱۴/۲	۱۷	۷۸/۳	۹۴		اجبار به انجام چندین کار همزمان
۱۵/۰	۱۸	۱۰/۰	۱۲	۷۵/۰	۹۰		منحرف شدن تمرکز
۱۵/۰	۱۸	۱۹/۲	۲۳	۶۵/۸	۷۹		یک لحظه فراموشی و به یاد نیاوردن
۱۴/۲	۱۷	۱۵/۸	۱۹	۷۰/۰	۸۴		تصمیم اشتباه گرفتن
۱۲/۳	۱۶	۱۳/۳	۱۶	۷۳/۳	۸۸		ارزیابی اشتباه موقعیت
۱۱/۷	۱۴	۱۹/۲	۲۳	۶۹/۲	۸۳		عدم توجه به علائم هشداردهنده
۸/۳	۱۰	۱۶/۷	۲۰	۷۵/۰	۹۰		اطلاعات نادرست یا ناکافی
۱۳/۳	۱۶	۲۰/۸	۲۵	۶۵/۸	۷۹		اعتماد به قضاوت افراد دیگر
۱۵/۸	۱۹	۲۹/۲	۳۵	۵۵/۰	۶۶		عمل کردن مأموراء صلاح شخصی
۵/۸	۷	۱۱/۷	۱۴	۸۲/۵	۹۹		نداشتن اطلاعات کافی
۱۷/۵	۲۱	۲۰/۰	۲۴	۶۲/۵	۷۵		عدم روابط کافی و تعاملات لازم

علل بروز خطاهای

جدول ۲: فراوانی دیدگاه دانشجویان در مورد علل گزارش نکردن خطا

فراوانی  
 علل  
 خطا  
 نکردن  
 در پرستاری

مخالفم						نظری ندارم	موافقم	عبارات
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد		
۲۶/۷	۳۲	۳۰/۸	۳۷	۴۲/۵	۵۱	۴۲/۵	ترس از اینکه خبر در دانشکده پخش شود و سایر دانشجویان از آن مطلع شوند.	ترس از اینکه خبر در دانشکده پخش شود و سایر دانشجویان از آن مطلع شوند.
۲۵/۸	۳۱	۴۷/۵	۵۷	۲۶/۷	۲۲	۲۶/۷	اشتباه پرستاری دارای تعریف مشخصی نیست.	اشتباه پرستاری دارای تعریف مشخصی نیست.
۲۱/۷	۲۶	۳۰/۰	۳۶	۴۸/۳	۵۸	۴۸/۳	ترس از اطلاع یافتن پزشک و سرزنش شدن توسط او	ترس از اطلاع یافتن پزشک و سرزنش شدن توسط او
۱۷/۵	۲۱	۲۵/۰	۳۰	۵۷/۵	۶۹	۵۷/۵	ترس از آشکار شدن اشتباه و ایجاد مسائل قضایی به دنبال آن	ترس از آشکار شدن اشتباه و ایجاد مسائل قضایی به دنبال آن
۲۹/۲	۳۵	۳۱/۷	۳۸	۳۹/۲	۴۷	۳۹/۲	از نظر من بعضی خطاها پرستاری اهمیت گزارش دهنده ندارند.	از نظر من بعضی خطاها پرستاری اهمیت گزارش دهنده ندارند.
۲۰/۸	۲۵	۳۵/۰	۴۲	۴۴/۲	۵۳	۴۴/۲	ترس از اطلاع یافتن کارکنان بخش و سرزنش شدن توسط آنان	ترس از اطلاع یافتن کارکنان بخش و سرزنش شدن توسط آنان
۲۰/۰	۲۴	۳۰/۰	۳۶	۵۰/۰	۶۰	۵۰/۰	به دلیل اینکه در صورت بروز مشکل مری و اکنثی نامتناسب با شدت و اهمیت اشتباه از خود نشان می‌دهد.	به دلیل اینکه در صورت بروز مشکل مری و اکنثی نامتناسب با شدت و اهمیت اشتباه از خود نشان می‌دهد.
۱۹/۲	۲۳	۲۵/۸	۳۱	۵۵/۰	۶۶	۵۵/۰	ترس از آشکار شدن اشتباه شما و بروز عوارض جانبی در بیمار	ترس از آشکار شدن اشتباه شما و بروز عوارض جانبی در بیمار
۲۲/۵	۲۷	۲۵/۰	۳۰	۵۲/۵	۶۳	۵۲/۵	به دلیل این که مری بیش از حد به مراقبت از بیمار اهمیت می‌دهد و آن را به عنوان معیار کیفیت پرستاری در نظر می‌گیرد.	به دلیل این که مری بیش از حد به مراقبت از بیمار اهمیت می‌دهد و آن را به عنوان معیار کیفیت پرستاری در نظر می‌گیرد.
۱۷/۵	۲۱	۳۳/۳	۴۰	۴۹/۲	۵۹	۴۹/۲	به دلیل این که در صورت بروز مشکل مری فقط به شخصی که مرتكب اشتباه شده تمرکز می‌کند و سایر عوامل را در نظر نمی‌گیرد.	به دلیل این که در صورت بروز مشکل مری فقط به شخصی که مرتكب اشتباه شده تمرکز می‌کند و سایر عوامل را در نظر نمی‌گیرد.
۱۴/۲	۱۷	۳۰/۰	۳۶	۵۵/۸	۶۷	۵۵/۸	ترس از این که بیمار متوجه اشتباه من شود و نگرش منفی نسبت به من پیدا کند.	ترس از این که بیمار متوجه اشتباه من شود و نگرش منفی نسبت به من پیدا کند.
۲۷/۵	۳۳	۳۵/۰	۴۲	۳۷/۵	۴۵	۳۷/۵	وقتی من اشتباه خود را به مری اطلاع می‌دهم او بازخورد مثبتی به من ارائه نمی‌دهد.	وقتی من اشتباه خود را به مری اطلاع می‌دهم او بازخورد مثبتی به من ارائه نمی‌دهد.
۲۰/۸	۲۵	۳۰/۰	۳۶	۴۹/۲	۵۹	۴۹/۲	ترس از اطلاع دادن به مری و این که از طرف او فردی بی‌کفایت تلقی شوید.	ترس از اطلاع دادن به مری و این که از طرف او فردی بی‌کفایت تلقی شوید.
۱۸/۳	۲۲	۳۰/۸	۳۷	۵۰/۸	۶۱	۵۰/۸	پکی از علل گزارش نکردن خطاها فرمآوش کردن گزارش آن می‌باشد.	پکی از علل گزارش نکردن خطاها فرمآوش کردن گزارش آن می‌باشد.
۳۰/۸	۳۷	۳۲/۵	۳۹	۳۶/۷	۴۴	۳۶/۷	ترس از اطلاع دادن به مری و سرزنش شدن توسط او	ترس از اطلاع دادن به مری و سرزنش شدن توسط او
۱۸/۳	۲۲	۲۶/۷	۳۲	۵۵/۰	۶۶	۵۵/۰	ترس از تاثیر اشتباه در نمره ارزشیابی و بروز پیامدهای آموزشی به دنبال آن	ترس از تاثیر اشتباه در نمره ارزشیابی و بروز پیامدهای آموزشی به دنبال آن
۲۳/۳	۲۸	۱۹/۲	۲۳	۵۷/۵	۶۹	۵۷/۵		

در دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر بود. گزینه سوم "تمرکز مری بر شخصی که مرتكب اشتباه شده و عدم در نظر گرفتن سایر عوامل" نیز با هیچ یک از متغیرهای دموگرافیک رابطه معنی دار نداشت.

### بحث و نتیجه گیری

اتفاق عمل یکی از پرخطرترین بخش‌های بیمارستانی می‌باشد و خطاها پرستاری در آن می‌تواند منجر به آسیب‌های دموگرافیک به بیمار شود. خطاها پزشکی قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه‌ریزی یا اجرا تعريف می‌شود که به طور بالفعل یا بالقوه باعث یک نتیجه ناخواسته می‌شود (۸). این خطاها و اشتباهات به طور معمول اتفاق می‌افتد و به خاطر عوارض غیرقابل جبران در بیماران، کاهش آن یکی از اهداف مهم سازمان‌های بهداشتی درمانی است. کاهش خطاها پزشکی به عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت بالینی در قسمت مدیریت خطر اهمیت شایان توجهی دارد و چون علت بیشتر خطاها اشتباهات عملکردی می‌باشد، لذا مطالعه فرآیند بروز خطا و

نتایج رگرسیون لجستیک در خصوص گزینه‌های مربوط به فراوانی خطا نتایج نشان داد هیچ یک از متغیرهای دموگرافیک با گزینه اول "واکنش به خون یا فرآوردهای خونی" و گزینه دوم "عدم رعایت تکنیک استریل" و گزینه سوم "باقي ماندن جسم خارجی در محل جراحی" تفاوت معنی دار آماری را نشان ندادند ( $P > 0.05$ ). همچنین در مورد علل بروز خطا هیچ یک از متغیرهای دموگرافیک با سه گزینه "حوالس پرته"، "اجبار به انجام چندین کار همزمان" و "نداشتن اطلاعات کافی" ارتباط معنی دار آماری نداشتند ( $P > 0.05$ ). در مورد علل گزارش نکردن خطا نیز گزینه "ترس از آشکار شدن اشتباه و ایجاد مسائل قضایی به دنبال آن" با هیچ یک از متغیرهای دموگرافیک رابطه معنی دار نداشت. گزینه "ترس از تاثیر اشتباه در نمره ارزشیابی و بروز پیامدهای آموزشی به دنبال آن" با جنس رابطه معنی دار آماری ( $P < 0.04$ ) داشت ( $OR = 0.54$  و  $CI = 0.17 - 0.95$ ) و احتمال گزارش نکردن خطا به دلیل ترس از تاثیر اشتباه در نمره ارزشیابی و بروز پیامدهای آموزشی به دنبال آن

کاهش خطاهای می‌تواند مفید باشد.

نتایج حاصل از این مطالعات برای کاهش و پیشگیری از اشتباهات در اتاق عمل و دانشجویان می‌توان اقداماتی نظری تلاش جهت افزایش سطح علمی و عملی دانشجویان، تقسیم وظایف مشخص برای دانشجویان جهت جلوگیری از حواس پرته و عدم سردرگمی آنان در انجام تکنیک‌ها و استفاده از مریبان با تجربه و کارآزموده را انجام داد. بهدلیل این‌که دانشجویان در مرحله ابتدایی شکل‌گیری رفتارهای حرفه‌ای خود هستند و فرایند خطا‌بایی نظاممندی در مراکز آموزشی درمانی نیز وجود ندارد بنابراین دانشجویان از شیوه‌های شخصی در مواجهه با خطاهای استفاده می‌کنند (۷) که استفاده از برنامه‌های آموزشی به روز و جامع می‌تواند در ساماندهی این امر مفید باشد. لذا توجه به علل بروز خطا از سوی دانشجویان و ارتقاء راهکارهای پیشگیری از آن بهویژه از دید دست‌اندکاران امر آموزش مانند مریبان بالینی و علی‌الخصوص خود دانشجویان لازم و ضروری است. همچنین مباحث این‌می، خطا و روش‌های مقابله با آن می‌باشد در کوریکولوم پرستاری گنجانده و تدریس گردد.

نقشه شروع در کاهش خطا بررسی علل خطا و گسترش فرهنگ گزارش دادن خطا برای برنامه‌ریزی‌های مربوط به آن است (۱۰). پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد که پرستاران درک یکسانی از تعریف خطا ندارند (۶،۷،۸،۱۳) و همین مسئله باعث می‌شود که در برابر خطای انجام شده واکنش‌های متفاوتی را نشان دهند. مطالعات انجام گرفته بر روی دانشجویان در محیط‌های بالینی نشان می‌دهد که غالب دانشجویان خطاهای مراقبتی خود را پنهان می‌کنند (۷). براساس نتایج مطالعه یعقوبی (۲۰۱۵) نشان داد که ۵۸/۱ درصد دانشجویان مورد مطالعه مرتکب خطا شده که از این میان فقط ۱۶/۷ درصد از آنان خطاهای خود را به مربی مربوطه گزارش نمودند (۱۷). حیدری و همکاران نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که ۵۰ درصد از دانشجویان خطاهای خود را اطلاع می‌دهند (۱۶). براساس مطالعه کوهستانی نیز ۷۰ درصد دانشجویان خطاهای خود را به مربی اطلاع می‌دهند (۱) که با توجه به این مطالعات نتایج متفاوتی برای میزان گزارش‌دهی خطا از سوی دانشجویان وجود دارد. مطالعه سرحدی و همکاران (۲۰۱۴) نیز نشان داد که بیشترین دلایل مربوط به عدم گزارش‌دهی خطا از سوی دانشجویان به دلیل ترس از پیامدهای گزارش‌دهی بود (۷) که با این مطالعه همسو است. در مطالعه کوهستانی نیز بیشترین

اقدامات بعد از آن جهت انجام مداخلات و اقدامات لازم برای براساس نتایج حاصل از این مطالعه بیشترین نوع خطا از دیدگاه دانشجویان به ترتیب مربوط به عدم رعایت تکنیک استریل، واکنش به خون یا فرآوردهای خونی، باقی ماندن جسم خارجی در محل جراحی و محاسبه اشتباه دوز/ دوام داروها بود و بیشترین دلایلی را که برای بروز خطا از سوی دانشجویان ارائه شد به ترتیب شامل نداشتن اطلاعات کافی، حواس‌پرته، اجبار به انجام چندین کار همزمان و خستگی بود. در مطالعه طیفوری و ولیئی بر روی پرستاران اتاق عمل نیز بیشترین خطا مربوط به عدم رعایت تکنیک استریل بود و پس از آن گزینه‌های شمارش نادرست گازهای جراحی و شمارش نادرست ابزار جراحی به عنوان خطاهای رایج در بین پرستاران شاغل در اتاق عمل گزارش شد. در مطالعه خالوئی و همکاران (۲۰۱۳) وضعیت این‌می بیماران در اتاق عمل ۳۳/۳ درصد در ایران نامطلوب گزارش گردید (۲۰). همچنین مطالعه گرجی و همکاران (۲۰۱۳) نیز عنوان گردید که بین ۵۰ درصد تا دو سوم خطاهای پزشکی در بخش اتاق عمل و اورژانس بیمارستان‌ها اتفاق می‌افتد که بیش از نیمی از آن‌ها قابل پیشگیری‌اند (۱۴). لذا با توجه به این‌که محیط اتاق عمل به‌دلیل انجام پروسیجرهای تهاجمی متعدد، بستری برای بروز انواع خطاهای است، لذا مهم است که با روش‌های مختلف شایع‌ترین خطاهای به کارکنان و دانشجویان بادآوری شده و راههای پیشگیری از آن‌ها نیز مورد تأکید قرار گیرد. بیشترین دلایل بروز خطا نیز به ترتیب خستگی، اطلاعات نادرست یا ناکافی و حواس‌پرته بودند (۱۹). گرجی و همکاران (۲۰۱۳) نیز در مطالعه خود به ترتیب سه عامل سهل‌انگاری و بی‌توجهی، مشکل مدیریت تجهیزات و بی‌تجربگی و تازه کار بودن را سه علت مهم بروز خطاهای شناسایی شده در اتاق عمل معرفی می‌کنند (۱۴). در مطالعه بلوجی بیدختی و همکاران (۲۰۱۴) نیز بیشترین دلایلی را که منجر به بروز اشتباه می‌شوند به ترتیب شامل دستورات مخدوش پزشک، بار کاری زیاد و تعداد کم نیروی انسانی بود (۲۱). کمبود آگاهی ارائه دهنده‌گان مراقبت‌های بهداشتی به عنوان رایج‌ترین علت بروز خطاهای پزشکی مطرح می‌باشد (۲۲). خستگی یکی از مهم‌ترین عوامل بروز خطا در هر حرفه‌ای می‌باشد و مطالعات بسیاری رابطه بین خستگی و بروز خطاهای بالینی را نشان داده‌اند (۲۳، ۲۴). خستگی جنبه‌های مختلفی عاطفی و فیزیکی دارد که می‌تواند تاثیر منفی بر عملکرد گذاشته و درنهایت منجر به بروز خطا از جانب پرستاران گردد. براساس

رعايت تکنيك استريل، واکنش به خون یا فرآورده‌های خونی و باقی ماندن جسم خارجی در محل جراحی بود. مهم‌ترین علل بروز خطای از ديدگاه دانشجویان شامل نداشتن اطلاعات کافی، حواس‌پرتی و اجبار به انجام چندين کار همزمان گزارش شد. مهم‌ترین علل گزارش نکردن خطا نيز به ترتیب ترس از آشکار شدن اشتباه و ايجاد مسائل قضایي به دنبال آن و ترس از تاثير اشتباه در نمره ارزشیابی و بروز پیامدهای آموزشی به دنبال آن بودند. باتوجه به اين که خطاهای پرستاری در اتاق عمل تاثير قابل توجهی بر ايماني بيماران و همچنین با توجه به احتماناًپذير بودن خطاهای، برسی مداوم خطاهای رايچ و علل بروز آن‌ها در گروه‌های مختلف بویژه دانشجویان جهت پيشگيري ضروري می‌باشد. افزایش مهارت‌های علمی و عملی دانشجویان برای کاهش خطاهای در آينده لازم است که در اين راستا استفاده از مربیان با تجربه، اجتناب از پاسخ‌های مخرب به دانشجویان در برابر خطاهای، تشویق فرهنگ گزارش‌دهی خطای خصوص در دانشجویان با حمایت از آن‌ها، عدم تاثير بر ارزشیابی دانشجویان و همچنین ايجاد کلاس‌های بازآموزی برای مربیان پیشنهاد می‌شود.

### قدرتانی

این مقاله حاصل طرح پژوهشی مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به شماره ۱۳۹۵/۶۷ می‌باشد. لذا نویسنده‌گان از شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سنتنجه به دليل حمایت‌های مالی و همچنین دانشجویان شرکت‌کننده در پژوهش تشکر می‌نمایند.

علت عدم گزارش خطای در حیطه ترس از پیامدهای گزارش دهی و مربوط به عبارت ترس از تاثیر در نمره ارزشیابی و پیامدهای آموزشی بود (۱). در مطالعه صیدی و همکاران (۲۰۱۲) بيشرین دليل برای عدم گزارش خطای كمبود اطلاعات در مورد فرایند گزارش خطای و فراموش نمودن خطا بود (۲). يعقوبي و همکاران (۲۰۱۵) نيز در مطالعه خود كه اينار مشترکی با پژوهش حاضر داشت گزارش كردن که بيشرین علت عدم گزارش خطای در دانشجویان پرستاری مربوط به "ترس از اينکه خبر در دانشکده درج شود و دیگر دانشجویان از آن مطلع شوند" بود (۲). لذا مربیان باليني می‌بايست ضمن فراهم کردن جو مناسب، زمينه گزارش خطای از سوی دانشجویان را فراهم نموده و در جهت رفع موانع آن گام بردارند. همچنین حمایت از دانشجویان بعد از گزارش خطای و تمرکز بر سیستم به جای تمرکز بر فرد می‌تواند زمينه گزارش خطای را فراهم نماید.

از محدودیت‌های اين مطالعه می‌توان به عدم دقت و يا کم حوصله بودن برخی دانشجویان در پر کردن پرسشنامه و يا كامل پرنکردن آن که باعث حذف پرسشنامه از مطالعه شد، اشاره کرد. پیشنهاد می‌شود تاثیر دوره‌ها و روش‌های مختلف آموزشی و گزارش‌دهی بر میزان خطای و گزارش آن در دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد. همچنین محتواي آموزشی برای دانشجویان در جهت کاهش بروز خطا طرح‌ريزی گردد. گسترش فرهنگ گزارش‌دهی داوطلبانه خطاهای، در کنار به اشتراك‌گذاري تجارب می‌تواند از اولويت‌های مدیران در مدیریت خطای و ارزیابی خطای در نظام حاكمیت بالینی باشد. در مجموع نتایج نشان داد بيشرین میزان خطای مربوط به عدم

## References

1. Kouhestani H, Baghcheghi N. [Refusal in Reporting Medication Errors from the Viewpoints of Nursing Students in Arak University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education 2009; 8 (2): 285-91. [persian]
2. Koohestani H, Baghcheghi N. Barriers to the reporting of medication administration errors among nursing students. Australian Journal Of Advanced Nursing 2009; 27 (1): 66-74.
3. Goras C, Wallentin F, Nilsson U, Ehrenberg A. Swedish translation and psychometric testing of safety attitudes questionnaire (operating room version). BMC Health Services Research 2013; 13 (104): 1-7.
4. Mansouri A, Ahmadvand A, Hadjibabaie M, Kargar M, Javadi M, Gholami K. [Type and severity of medication errors in Iran]. DARU Journal of pharmaceutical Sciences 2013; 21 (0): 49-59. [persian]

5. Mirzaei M, Khatony A, Safari Faramani R, Sepahvand E. [Prevalence, Types of Medication errors and Barriers to Reporting Errors by Nurses in an Educational Hospital in Kermanshah]. Journal of School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences 2013; 19 (3): 28-37. [persian]
6. Mohammad Nejad I, Hojjati H, Sharifniya SH, Ehsani SR. [Evaluation of medication error in nursing students in four educational hospitals in Tehran]. IJME 2010; 3 (0): 60-9. [persian]
7. Sarhadi M, Sheikhbardsiri H, Dastras M, Moein H. [A Comparative Study of Barriers to Reporting Medication Errors in Nursing Students in Zahedan University of Medical Sciences, Iran, in 2013]. J Manage Med Inform Sch 2014; 2 (1): 38-46. [persian]
8. Musarezaie A, Momeni Ghale Ghasemi T, Zargham-Boroujeni A, Haj-Salhehi E. [Survey of the Medication Errors and Refusal to Report Medication Errors from the Viewpoints of Nurses in Hospitals Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Iran]. J Health Syst Res 2013; 9 (1): 76-85. [persian]
9. Reid-Searl K, Moxham L, Walker S. [Medication administration and final year nursing students]. Studies in Learning Evaluation Innovation and Developmen 2008; 5 (2): 46-55. [persian]
10. Saghiri S. [The errors of nursing and develop strategies to reduce errors in nurses]. Journal of Department of NursingArmy Islamic Republic of Iran 2010; 2 (10): 35-40. [persian]
11. Mutua Ndambuki J, Odhiambo E, Chege M, Mirie W. Factors influencing Quality Management of Medication by Nursesat Kenyatta National Hospital Paediatric Wards. Nairobi, Kenya. Journal of Biology, Agriculture and Healthcare 2013; 3 (18): 93-98.
12. Seidi M, Zardosht R. [Survey of Nurses' Viewpoints on Causes of Medicinal Errors and Barriers to Reporting inPediatric Units in Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences]. Journal of Fasa University of Medical Sciences 2012; 2 (3): 142-147. [persian]
13. Mirzaee H, Mostafaie D, Estebsari F, Bastani P, Kalhor R, Tabatabaei S. Medication Errors in Hospitals: A Study of Factors Affecting Nursing Reporting in a Selected Center Affiliated with Shahid Beheshti University of Medical Sciences. J Pharm Care 2014; 2 (3): 96-102.
14. Gorji H, Ravaghi H, Pirouzi M, Mansourzade A. [Utilizing Integrated Prospective and Retrospective Risk Analysis Method on General Processes Patient Flow in Operating Room in Seyed Alshohada Hospital in Semiroom, Iran]. Health Inf Manage 2013; 10 (3): 1-10. [persian]
15. Movahednia S, Partovishayan Z, Bastanitehrani M, Moradi F. [Nurse Managers' perspectives about Reasons for not reporting medicalerrors in Firoozgar Hospital]. Razi Journal of Medical Sciences 2014; 21 (125): 110-8. [persian]
16. Heidari S, Shahabinejad M, Soltani A, Abdoli F. [Rate and type of medication errors and factors in preventing the report of them in the nursing students]. Community Health journal. 2013; 2, 3 (7): 48-55. [persian]
17. Yaghoobi M, Navidian A, Charkhat-Gorgich EA-H, Chackerzahi F, Salehiniya H. [Survey of medication errors in nursing student and reasons for not reporting it from their perspective]. Journal of nurse and physician within war 2015; 3 (6): 5-11. [persian]
18. Chard R. How perioperative nurses define, attribute causes of, and react to intraoperative nursing errors. AORN Journal 2010; 91 (1): 132-45. [persian]
19. Taifoori L, Valiee S. Understanding or Nurses' Reactions to Errors and Using This Understanding to Improve Patient Safety. ORNAC Journal 2015; 33 (3): 13-22.

20. Khalooei A, Rabori MM, Nakhaee N. [Safety condition in Hospitals Affiliated to Kerman University of Medical Sciences, 2010]. Journal of Health & Development. 2013; 2 (3): 192-202. [persian]
21. Baloochi Beydokhti T, MohammadPour A, Shabab S, Nakhaee H. [Related factors of medication errors and barriers of their reporting in the medical staff in hospitals of Gonabad University of Medical Sciences]. Quarterly of the Horizon of Medical Sciences 2014; 19 (5): 289-95. [persian]
22. Naylor R. Medication Errors: Lessons for Education and Health care. Oxon: Radcliffe Medical Press Ltd; 2002.
23. Barker LM, Nussbaum MA. The effects of fatigue on performance in simulated nursing work. Ergonomics 2011; 54 (9): 815-29.
24. Maiden J, Georges JM, Connelly CD. Moral distress, compassion fatigue, and perceptions about medication errors in certified critical care nurses. Dimens Crit Care Nurs 2011; 30 (6): 339-45.

# Frequency, Causes and Reporting Barriers of Nursing Errors in the Operating Room Students

Azarabad Sh<sup>1</sup>, Zaman SS<sup>2</sup>, Nouri B<sup>3</sup>, Valiee S<sup>4\*</sup>

Received: 2017/11/14

Accepted: 2018/06/20

## Abstract

**Introduction:** Operating room with respect to multiple invasive procedures can be a context for the incidence of nursing errors. Also, students are in the process of learning that can lead to errors by them. This study aimed to determine the rate, causes and reporting barriers of nursing errors in the operating room students of Kurdistan University of Medical Sciences in 2016.

**Methods:** In this descriptive and cross-sectional study 120 students of operating room that have been chosen by census method participated. To collect data a three-part questionnaire including (demographic characteristics, frequency of error, the causes of errors and error reporting barriers) was used. Data analysis using descriptive statistics by SPSS was performed.

**Results:** Most nursing errors were related to non-compliance with sterile technique (78.3 percent), reactions to blood or blood products (75.5 percent) and retention of foreign bodies in the surgical incision (73.3 percent), respectively. The most important causes of nursing errors from the perspective of students were the lack of sufficient information (82.5 percent), distraction (79.2 percent) and forced to perform multi-tasks simultaneously (78.3 percent). The most important causes for refusing to report the error were the fear of disclosure of mistakes and following by justice issues (57.5 percent) and fear of the impact of errors in the evaluation and educational consequences (57.5 percent), respectively.

**Conclusions:** Prevention is the best way of reducing errors, so by recognizing the type and causes of nursing errors in the view of operating room students, clinical instructors should perform necessary preventive actions especially in the clinical training period. Promoting culture of reporting errors, especially in college by supporting them and reduce the impact on student evaluation is recommended.

**Keywords:** Safety, Medical Error, Nurses, Operating rooms, Students

**Corresponding Author:** Valiee S, Clinical Care Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran  
valiee@muk.ac.ir

Azarabad Sh, Operating Room student, Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

Zaman S S, Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

Nouri B, Social Determinants of Health Research Center, Research institute for health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran